



Graubrust-Strandläufer – Pectoral Sandpiper – *Calidris melanotos*.  
Foto: L. Ritzel, Helgoland, Oktober 2011.

## Überarbeitung der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission zum 1. Januar 2011

Deutsche Avifaunistische Kommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten

Der Status von Vogelarten kann sich innerhalb weniger Jahre verändern und ist sehr dynamisch. Silberreiher waren noch vor 20 Jahren seltene Gäste in Deutschland, sind inzwischen aber zu jeder Jahreszeit zu beobachten. Umgekehrt verschwinden auch Arten, die wie beispielsweise die Blauracke früher regelmäßige Brutvögel in Deutschland waren und heute zu Ausnahmereischeinungen gehören. Die letzte grundlegende Überarbeitung der Meldeliste durch die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) gab es zum 1. Januar 2001 (DSK 2001). Seitdem wurden kleinere Änderungen zum 1. September 2007 und zum 1. Januar 2009 auf der Homepage der DSK ([www.limicola.de/dsk.html](http://www.limicola.de/dsk.html)) bekannt gegeben. Mit der Einrichtung der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) wurde die nationale Meldeliste zum 1. Januar 2011 einer Aktualisierung unterzogen. Diese Überarbeitung orientierte sich an den in den zurückliegenden Jahren gesammelten Ergebnissen, Entwicklungen und Erfahrungen.

### Ergänzungen der nationalen Meldeliste zum 1. Januar 2011

Folgende ab 2001 neu nachgewiesene Arten wurden der nationalen Meldeliste hinzugefügt:

- Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus* (erster Nachweis 2006; WEGST 2008),
- Petschorapieper *Anthus gustavi* (2007; STOHL & GOTTSCHLING 2008),
- Carolinataube *Zenaida macroura* (2008; DSK 2009),
- Steinortolan *Emberiza buchanani* (2009; STÜHMER & PORTOFÉE 2010)
- Langzehen-Strandläufer *Calidris subminuta* (2011; GRUBER & JORTZICK 2011),

Neu in die Liste aufgenommen wurde auch der Rotkopfwürger *Lanius senator*, da im Mittel der letzten zehn Jahre weniger als 15 Nachweise pro Jahr vorliegen.

### Von der nationalen Meldeliste zum 1. Januar 2011 gestrichene Arten

Es wurden generell alle Arten gestrichen, von denen in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt mindestens 15 Nachweise pro Jahr erfolgten bzw. die regelmäßig – wenn auch teilweise nur sehr lokal – in Deutschland brüten.

Eistaucher <i>Gavia immer</i>	regelmäßiger Durchzügler und Wintergast
Rosaflamingo <i>Phoenicopterus roseus</i>	regelmäßiger Gast und Brutvogel (Nordrhein-Westfalen)
Wellenläufer <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	regelmäßig in der Nordsee und im Küstenbereich
Eissturmvogel <i>Fulmarus glacialis</i>	regelmäßiger deutscher Brutvogel (Helgoland)
Dunkler Sturmtaucher <i>Puffinus griseus</i>	regelmäßig in der Nordsee und im Küstenbereich
Atlantischer Kormoran <i>Phalacrocorax c. carbo</i>	regelmäßiger Gast (FLORE & HÜPPOP 1997)
Krähenscharbe <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	regelmäßig in der Nordsee (besonders Helgoland), sonst selten
Basstölpel <i>Sula bassana</i>	regelmäßiger deutscher Brutvogel (Helgoland)
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	regelmäßiger Gast
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	regelmäßiger deutscher Brutvogel (Alpenraum)
Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	regelmäßiger deutscher Brutvogel (Küste)
Isländische Uferschnepfe <i>Limosa l. islandica</i>	regelmäßiger Durchzügler, besonders in Norddeutschland
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	alljährlicher Durchzügler (>15 Nachweise.pro Jahr)
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	alljährlicher Durchzügler (>15 Nachweise.pro Jahr)
Meerstrandläufer <i>Calidris maritima</i>	regelmäßiger Durchzügler und Wintergast im Küstenbereich
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich
Skua <i>Stercorarius skua</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich
Krabbentaucher <i>Alle alle</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich
Tordalk <i>Alca torda</i>	regelmäßiger Brutvogel (Helgoland)
Trottellumme <i>Uria aalge</i>	regelmäßiger Brutvogel (Helgoland)
Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i>	regelmäßiger Durchzügler im Küstenbereich (>15 Nachweise.pro Jahr)
Lachseschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	lokaler, aber regelmäßiger Brutvogel im Küstenbereich
Alpensegler <i>Apus melba</i>	lokaler, aber regelmäßiger Brutvogel (Süddeutschland)
Dreizehenspecht <i>Picoides tridactylus</i>	regelmäßiger Brutvogel (Alpenraum, einige Mittelgebirge)
Weißrückenspecht <i>Dendrocopos leucotos</i>	regelmäßiger Brutvogel (Alpenraum)
Alpendohle <i>Pyrhocorax graculus</i>	regelmäßiger Brutvogel (Alpenraum)
Felsenschwalbe <i>Ptyonoprogne rupestris</i>	regelmäßiger Brutvogel (Alpenraum)
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	regelmäßiger Brutvogel (Süddeutschland)
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	alljährlicher Durchzügler (>15 Nachweise.pro Jahr)
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	regelmäßiger Brutvogel in Südwestdeutschland
Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	regelmäßiger Brutvogel (Alpenraum)
Rotdrossel <i>Turdus iliacus coburni</i>	wohl regelmäßiger Durchzügler (zumindest auf Helgoland; DIERSCHKE et al. 2010 & 2011)
Steinrötel <i>Monticola saxatilis</i>	lokaler Brutvogel im Alpenraum
Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i>	regelmäßiger Brutvogel im Alpenraum
Schneesperling <i>Montifringilla nivalis</i>	regelmäßiger Brutvogel in den Hochalpen
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	alljährlicher Durchzügler (>15 Nachweise.pro Jahr), besonders im Herbst an den Küsten
Strandpieper <i>Anthus petrosus</i>	regelmäßiger Durchzügler und Wintergast im Küstenbereich
Zitronenzeisig <i>Carduelis citrinella</i>	regelmäßig Brutvogel in Alpen und Schwarzwald
Zaunammer <i>Emberiza cirlus</i>	regional regelmäßiger Brutvogel
Zippammer <i>Emberiza cia</i>	regional regelmäßiger Brutvogel

**Nationale Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission ab 1. Januar 2011**

ssp. = Subspezies/Unterart, nur die genannte Unterart ist zu dokumentieren

\* Der Habichtskauz brütet zwar im Nationalpark Bayerischer Wald, er profitiert dort jedoch von Zufütterungen. Alle Beobachtungen abseits des bekannten Gebietes sollen gemeldet werden.

Weißkopf-Ruderente <i>Oxyura leucocephala</i>
Pfeifschwan <i>Cygnus columbianus</i>
Ringelgans <i>Branta bernicla</i> ssp. <i>nigricans</i>
Blässgans <i>Anser albifrons</i> ssp. <i>flavirostris</i>
Marmelente <i>Marmaronetta angustirostris</i>
Kanadapfeifente <i>Anas americana</i>
Carolinakrickente <i>Anas carolinensis</i>
Blauflügelente <i>Anas discors</i>
Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i>
Kleine Bergente <i>Aythya affinis</i>
Scheckente <i>Polysticta stelleri</i>
Prachteiderente <i>Somateria spectabilis</i>
Kragenente <i>Histrionicus histrionicus</i>
Brillenente <i>Melanitta perspicillata</i>
Pazifiktrauerente <i>Melanitta americana</i>
Spatelente <i>Bucephala islandica</i>
Steinhuhn <i>Alectoris graeca</i>
Bindentaucher <i>Podilymbus podiceps</i>
Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i>
Buntfuß-Sturmschwalbe <i>Oceanites oceanicus</i>
Sturmschwalbe <i>Hydrobates pelagicus</i>
Madeirawellenläufer <i>Oceanodroma castro</i>
Schwarzbrauenalbatros <i>Thalassarche melanophris</i>
Albatros, unbestimmt <i>Thalassarche/Diomedea</i> spec.
Großer Sturmtaucher <i>Puffinus gravis</i>
Sepiasturmtaucher <i>Puffinus diomedea</i>
Atlantiksturmtaucher <i>Puffinus puffinus</i>
Balearensturmtaucher <i>Puffinus mauretanicus</i>
Kleiner Sturmtaucher <i>Puffinus baroli</i>
Krauskopfpelikan <i>Pelecanus crispus</i>
Rosapelikan <i>Pelecanus onocrotalus</i>
Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i>
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>
Schmuckkreiher <i>Egretta thula</i>
Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i>
Bartgeier <i>Gypaetus barbatus</i>
Schmutzgeier <i>Neophron percnopterus</i>

Schlangenadler <i>Circus gallicus</i>
Mönchsgeier <i>Aegypius monachus</i>
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>
Schelladler <i>Aquila clanga</i>
Zwergadler <i>Aquila pennata</i>
Habichtsadler <i>Aquila fasciata</i>
Steppenadler <i>Aquila nipalensis</i>
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>
Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>
Habicht <i>Accipiter gentilis</i> ssp. <i>buteoides</i>
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i> ssp. <i>vulpinus</i>
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>
Eleonorenfalke <i>Falco eleonora</i>
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>
Würgfalke <i>Falco cherrug</i>
Rötelfalke <i>Falco naumanni</i>
Jungfernkranich <i>Grus virgo</i>
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>
Steppenkragentrappe <i>Chlamydotis macqueenii</i>
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>
Bronzesultanshuhn <i>Porphyrio alleni</i>
Purpurhuhn <i>Porphyrio porphyrio</i>
Triel <i>Burhinus oedicnemus</i>
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i> ssp. <i>longipes</i>
Prärie-Goldregenpfeifer <i>Pluvialis dominica</i>
Tundra-Goldregenpfeifer <i>Pluvialis fulva</i>
Prärie/Tundra- Goldregenpfeifer <i>P. dominica/fulva</i>
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>
Weißschwanzkiebitz <i>Vanellus leucurus</i>
Wüstenregenpfeifer <i>Charadrius leschenaultii</i>
Wermutregenpfeifer <i>Charadrius asiaticus</i>
Prärieläufer <i>Bartramia longicauda</i>
Dünnschnabel-Brachvogel <i>Numenius tenuirostris</i>
Kleiner Schlammmläufer <i>Limnodromus griseus</i>
Großer Schlammmläufer <i>Limnodromus scolopaceus</i>
Schlammmläufer, unbestimmt <i>Limnodromus</i> spec.
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i> ssp. <i>faeroensis</i>

Wilsonwassertreter <i>Phalaropus tricolor</i>
Drosseluferläufer <i>Actitis macularius</i>
Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>
Kleiner Gelbschenkel <i>Tringa flavipes</i>
Bindenstrandläufer <i>Micropalama himantopus</i>
Grasläufer <i>Tryngites subruficollis</i>
Großer Knutt <i>Calidris tenuirostris</i>
Sandstrandläufer <i>Calidris pusilla</i>
Rotkehl-Strandläufer <i>Calidris ruficollis</i>
Wiesenstrandläufer <i>Calidris minutilla</i>
Langzehen-Strandläufer <i>Calidris subminuta</i>
Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>
Bairdstrandläufer <i>Calidris bairdii</i>
Spitzschwanz-Strandläufer <i>Calidris acuminata</i>
Rennvogel <i>Cursorius cursor</i>
Schwarzflügel-Brachschwalbe <i>Glareola nordmanni</i>
Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincta</i>
Brachschwalbe, unbestimmt <i>Glareola spec.</i>
Papageitaucher <i>Fratercula arctica</i>
Dickschnabellumme <i>Uria lomvia</i>
Gryllsteite <i>Cephus grylle ssp. mandtii</i>
Elfenbeinmöwe <i>Pagophila eburnea</i>
Rosenmöwe <i>Hydrocoloeus roseus</i>
Bonapartemöwe <i>Larus philadelphia</i>
Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>
Aztekenmöwe <i>Larus atricilla</i>
Präriemöwe <i>Larus pipixcan</i>
Fischmöwe <i>Larus ichthyaetus</i>
Korallenmöwe <i>Larus audouinii</i>
Ringschnabelmöwe <i>Larus delawarensis</i>
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>
Tundramöwe <i>Larus heuglini</i>
Kanadamöwe <i>Larus smithsonianus</i>
Polarmöwe <i>Larus glaucoides</i>
Noddiseeschwalbe <i>Anous stolidus</i>
Rußseeschwalbe <i>Onychoprion fuscata</i>
Zügelseeschwalbe <i>Onychoprion anaethetus</i>
Rüppellseeschwalbe <i>Sterna bengalensis</i>
Schmuckseeschwalbe <i>Sterna elegans</i>
Rosenseeschwalbe <i>Sterna dougallii</i>
Steppenflughuhn <i>Syrhaptes paradoxus</i>
Sandflughuhn <i>Pterocles orientalis</i>

Orientturteltaube <i>Streptopelia orientalis</i>
Carolinataube <i>Zenaida macroura</i>
Schwarzschnabelkuckuck <i>Coccyzus erythrophthalmus</i>
Häherkuckuck <i>Clamator glandarius</i>
Sperbereule <i>Surnia ulula</i>
Zwergohreule <i>Otus scops</i>
Schneeeule <i>Bubo scandiacus</i>
Habichtskauz <i>Strix uralensis*</i>
Pharaonenziegenmelker <i>Caprimulgus aegyptius</i>
Fahlsegler <i>Apus pallidus</i>
Haussegler <i>Apus affinis</i>
Blauracke <i>Coracias garrulus</i>
Blauwangenspint <i>Merops persicus</i>
Kleinspecht <i>Dryobates minor ssp. minor</i>
Rotaugenvireo <i>Vireo olivaceus</i>
Gelbkehlvireo <i>Vireo flavifrons</i>
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>
Braunwürger <i>Lanius cristatus</i>
Isabellwürger <i>Lanius isabellinus</i>
Raubwürger <i>Lanius excubitor ssp. homeyeri</i>
Alpenkrähe <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Elsterdohle <i>Coloeus dauuricus</i>
Lasurmeise <i>Parus cyanus</i>
Weidenmeise <i>Parus montanus ssp. borealis</i>
Kalanderlerche <i>Melanocorypha calandra</i>
Bergkalanderlerche <i>Melanocorypha bimaculata</i>
Weißflügellerche <i>Melanocorypha leucoptera</i>
Mohrenlerche <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>
Kurzzechenlerche <i>Calandrella brachydactyla</i>
Stummellerche <i>Calandrella rufescens</i>
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>
Bartmeise <i>Panurus biarmicus ssp. ruscicus</i>
Seidensänger <i>Cettia cetti</i>
Bartlaubsänger <i>Phylloscopus schwarzi</i>
Dunkellaubsänger <i>Phylloscopus fuscatus</i>
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita ssp. tristis</i>
Iberienzilpzalp <i>Phylloscopus ibericus</i>
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Ph. proregulus</i>
Tianschan-Laubsänger <i>Phylloscopus humei</i>
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>
Wacholderlaubsänger <i>Phylloscopus nitidus</i>

Wanderlaubsänger <i>Phylloscopus borealis</i>
Kronenlaubsänger <i>Phylloscopus coronatus</i>
Streifenschwirl <i>Locustella certhiola</i>
Strichelschwirl <i>Locustella lanceolata</i>
Mariskenhirsänger <i>Acrocephalus melanopogon</i>
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>
Buschrohrsänger <i>Acrocephalus dumetorum</i>
Feldrohrsänger <i>Acrocephalus agricola</i>
Blassspötter <i>Hippolais pallida</i>
Buschspötter <i>Hippolais caligata</i>
Steppenspötter <i>Hippolais rama</i>
Zistensänger <i>Cisticola juncidis</i>
Orpheusgrasmücke <i>Sylvia hortensis</i>
Wüstengrasmücke <i>Sylvia nana</i>
Brillengrasmücke <i>Sylvia conspicillata</i>
Provencegrasmücke <i>Sylvia undata</i>
Weißbart-Grasmücke <i>Sylvia cantillans</i>
Samtkopf-Grasmücke <i>Sylvia melanocephala</i>
Katzenvogel <i>Dumetella carolinensis</i>
Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>
Erddrossel <i>Zoothera dauma</i>
Schieferdrossel <i>Geokichla sibirica</i>
Einsiedlerdrossel <i>Catharus guttatus</i>
Zwergdrossel <i>Catharus ustulatus</i>
Grauwangendrossel <i>Catharus minimus</i>
Weißbrauendrossel <i>Turdus obscurus</i>
Rostschwanzdrossel <i>Turdus naumanni</i>
Rostflügeldrossel <i>Turdus eunomus</i>
Rotkehlrossel <i>Turdus ruficollis</i>
Schwarzkehlrossel <i>Turdus atrogularis</i>
Einfarbdrossel <i>Turdus unicolor</i>
Fahldrossel <i>Turdus pallidus</i>
Wanderdrossel <i>Turdus migratorius</i>
Heckensänger <i>Cercotrichas galactotes</i>
Pallasschwarzkehlchen <i>Saxicola maurus</i>
Blauschwanz <i>Tarsiger cyanurus</i>
Rubinkehlchen <i>Luscinia calliope</i>
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> ssp. <i>phoenicuroides</i>

Gartenrotschwanz <i>Ph. phoenicurus</i> ssp. <i>samamisticus</i>
Isabellsteinschmätzer <i>Oenanthe isabellina</i>
Wüstensteinschmätzer <i>Oenanthe deserti</i>
Maurensteinschmätzer <i>Oenanthe hispanica</i>
Balkansteinschmätzer <i>Oenanthe melanoleuca</i>
Nonnensteinschmätzer <i>Oenanthe pleschanka</i>
Zypernsteinschmätzer <i>Oenanthe cypriaca</i>
Saharasteinschmätzer <i>Oenanthe leucopyga</i>
Schwarzkehlbraunelle <i>Prunella atrogularis</i>
Steinsperling <i>Petronia petronia</i>
Steppenpieper <i>Anthus godlewskii</i>
Petschorapieper <i>Anthus gustavi</i>
Waldpieper <i>Anthus hodgsoni</i>
Pazifikpieper <i>Anthus rubescens</i>
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>
Maskenschafstelze <i>Motacilla feldegg</i>
Aschkopf-Schafstelze <i>Motacilla cinereocapilla</i>
Wolgaschafstelze <i>Motacilla lutea</i>
Hakengimpel <i>Pinicola enucleator</i>
Wüstengimpel <i>Bucanetes githagineus</i>
Bindenkreuzschnabel <i>Loxia bifasciata</i>
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i>
Birkenzeisig <i>Carduelis flammea</i> ssp. <i>rostrata</i>
Polarbirkenzeisig <i>Carduelis hornemanni</i>
Fichtenammer <i>Emberiza leucocephalos</i>
Türkenammer <i>Emberiza cineracea</i>
Grauortolan <i>Emberiza caesia</i>
Steinortolan <i>Emberiza buchanani</i>
Rohammer <i>Emberiza schoeniclus</i> ssp. <i>tschusii</i>
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>
Maskenammer <i>Emberiza spodocephala</i>
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>
Braunkopffammer <i>Emberiza bruniceps</i>
Weidenammer <i>Emberiza aureola</i>
Meisenwaldsänger <i>Parula americana</i>
Grünwaldsänger <i>Dendroica virens</i>
Rosenbrust-Kernknacker <i>Pheucticus ludovicianus</i>

### Zusammenfassung

**DAK 2012: Überarbeitung der nationalen Meldeliste der Deutschen Avifaunistischen Kommission zum 1. Januar 2011. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 64–69.**

Mit der Einrichtung der Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) wurde die nationale Meldeliste zum 1. Januar 2011 einer Aktualisierung unterzogen. Diese Überarbeitung orientierte sich an den in den zurückliegenden Jahren gesammelten Ergebnissen, Entwicklungen und Erfahrungen. Mit Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, Petschorapieper *Anthus gustavi*, Carolinatable *Zenaida macroura*, Steinortolan *Emberiza buchanani* und Langzehen-Strandläufer *Calidris subminuta* wurden fünf ab 2001 neu nachgewiesene Arten hinzugefügt. Der Rotkopfwürger *Lanius senator* musste aufgrund der starken Abnahme der Nachweiszahlen aufgenommen werden. Gestrichen wurden insgesamt 39 Arten sowie 3 Unterarten, von denen in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt mindestens 15 Nachweise pro Jahr erfolgten bzw. die regelmäßig in Deutschland brüten.

### Summary

**DAK 2012: Revision of the List of bird species and subspecies considered by the German Avifaunistic Commission from January 1st 2011. Seltene Vögel in Deutschland 2010: 64–69.**

With the establishment of the new German Avifaunistic Commission (DAK) the list of considered bird species and subspecies has been revised. This revision was based on the results, developments and experience gained in recent years. With Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus*, Pechora Pipit *Anthus gustavi*, Mourning Dove *Zenaida macroura*, Grey-necked Bunting *Emberiza buchanani* and Long-toed stint *Calidris subminuta*, five species first recorded in or after 2001 were added. Woodchat Shrike *Lanius senator* was added in response to a large decrease in the number of records. A total of 39 species and three subspecies having an average of at least 15 records per year or breeding regularly in Germany were deleted.

### Literatur

- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPOP, O. HÜPPOP & K. F. JACHMANN 2011: Die Vogelwelt der Insel Helgoland. OAG Helgoland, Helgoland.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE & H. SCHMALJOHANN 2010: Wie häufig sind Isländische Rotdrosseln *Turdus iliacus coburni* auf Helgoland? Ornith. Jber. Helgoland 20: 101–109.
- DSK 2001: Neue Meldelisten der Deutschen Seltenheitenkommission und der Avifaunistischen Landeskommissionen. Limicola 15: 265–288.
- DSK 2009: Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. Limicola 23: 257–334.
- FLORE, B.-O. & O. HÜPPOP 1997: Bestandsentwicklung, Durchzug und Herkunft des Kormorans *Phalacrocorax carbo* an einem Winterrastplatz auf Helgoland. J. Ornithol. 138: 253–270.
- GRUBER, D. & V. JORTZICK 2011: Der Langzehen-Strandläufer *Calidris subminuta*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 25: 101–107.
- STOHL, C. & M. GOTTSCHLING 2008: Ein Petschorapieper *Anthus gustavi* auf Helgoland – ein lange erwarteter deutscher Erstnachweis. Ornith. Jber. Helgoland 18: 84–91.
- STÜHMER, F. & C. PORTOFÉE 2010: Erster deutscher Nachweis des Steinortolans *Emberiza buchanani*, im Oktober 2009 auf Helgoland. Ornith. Jber. Helgoland 20: 83–90.
- WEGST, C. 2008: Der Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 22: 161–175.

Deutsche Avifaunistische Kommission – Dokumentationsstelle für seltene Vogelarten –  
c/o Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V., An den Speichern 4 a, 48157 Münster.  
E-Mail: [dak@dda-web.de](mailto:dak@dda-web.de), Internet: [www.dda-web.de/dak](http://www.dda-web.de/dak)